

Fiche de renseignement AUC Cellcept pour le Syndrome Néphrotique Pédiatrique

Etiquette patient

Poids : kg

Taille : cm

Indications cinétique

- | | |
|--|---|
| ☐ Initiation du traitement par MMF | ☐ Contrôle du traitement d'entretien |
| ☐ Contrôle d'une adaptation PK antérieure | ☐ Rechute |
| ☐ Effet indésirable | ☐ Bilan annuel systématique |

Lequel :

Statut du patient au moment de la cinétique

- | | |
|---|--|
| ☐ Patient en rémission récente | ☐ Patient en rémission stable |
| ☐ Patient en rechute partielle | ☐ Patient en rechute récente |
| ☐ Patient en pleine rechute | |

Quelle est pour vous l'efficacité du MMF au moment de la cinétique ?

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| ☐ Efficacité maximale | ☐ Efficacité partielle | ☐ Peu efficace |
| ☐ Pas efficace | ☐ Trop tôt pour dire quoi que ce soit | |

Quelle est pour vous la toxicité du MMF au moment de la cinétique

- ☐ Aucun effet secondaire
- ☐ Effets secondaires modérés ne nécessitant pas de diminuer la dose
- ☐ Effets secondaires moyens motivant une diminution de la dose
- ☐ Effets secondaires importants poussant à un arrêt du traitement

Informations concernant le syndrome néphrotique

- ☐ Mycophénolate → Posologie identique depuis plus de 3j : ☐ oui ☐ non
- ☐ Sirop ☐ Gélules ☐ Comprimés

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ☐ Cortancyl → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prises par jour : _____ |
| ☐ Ciclosporine → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prises par jour : _____ |
| ☐ Tacrolimus → Dose par prise (mg) : _____ | Nombre de prises par jour : _____ |
| ☐ Autres traitements. Préciser : | |

Protidémie (g/L) : _____

Albuminémie (g/L): _____

Protéinurie (g/L) : _____

Créatininémie (μmol/L) : _____

Créatininurie (μmol/L) : _____

Bandelettes urinaires : ☐ 0 ☐ traces ☐ + ☐ ++ ☐ +++ ☐ ++++

E-mail du clinicien demandeur : _____