



FICHE RENSEIGNEMENTS DIAGNOSTIC DE LA TRANSMISSION VIH MERE ENFANT

Informations concernant la mère	Informations concernant l'enfant
Nom de naissance :	Nom de naissance :
Prénom :	Prénom :
Date de naissance :	Date de naissance :

Infection maternelle
<input type="checkbox"/> VIH-1 <input type="checkbox"/> VIH-2

Cocher le niveau du risque de transmission mère-enfant (selon recommandations ANRS-MIE, CNS et HAS 2024)
<input type="checkbox"/> Scénario optimal
- Mère sous traitement ARV avant la conception ou au 1 ^{er} trimestre de grossesse - Avec CV < 50 copies/mL tout au long de la grossesse ou > 6 mois
<input type="checkbox"/> Faible risque de transmission
- Mère sous traitement ARV avant la conception ou en début de grossesse - Avec CV > 50 copies/mL dans les 6 derniers mois mais < 50 copies/mL dans les 4 semaines précédant l'accouchement et confirmée à l'accouchement
<input type="checkbox"/> Risque intermédiaire de transmission
- Mère avec CV entre 50 et 400 copies/mL dans les 4 semaines précédant l'accouchement
<input type="checkbox"/> Haut risque de transmission
- Mère n'ayant pas reçu de traitement ARV pendant la grossesse OU mère avec CV > 400 copies/mL dans les 4 semaines précédant l'accouchement ou le jour de l'accouchement

Accouchement
Dernière charge virale VIH maternelle : copies/mL Date :
<input type="checkbox"/> Voie basse <input type="checkbox"/> A terme <input type="checkbox"/> Césarienne <input type="checkbox"/> Prématurité : SA <input type="checkbox"/> Perfusion de ZDV

Allaitement
<input type="checkbox"/> Allaitement artificiel exclusif <input type="checkbox"/> Allaitement maternel ou mixte Début : Fin :

Traitement antirétroviral de l'enfant
<input type="checkbox"/> Névirapine <input type="checkbox"/> Zidovudine <input type="checkbox"/> Lamivudine <input type="checkbox"/> Raltégravir <input type="checkbox"/> Lopinavir <input type="checkbox"/> Autres : Début : Fin :

Acheminer l'ensemble des prélèvements à +5°C - Cocher les analyses sur le bon de Virologie	
Mère à la naissance : VRIP3 (1 tube EDTA mauve) + VCI (1 tube EDTA blanc nacré)	Enfant à chaque prélèvement : VRIP3 (1 tube EDTA mauve)

Renseignements cliniques supplémentaires - Commentaires
.....