


BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION DU NT PROBNP

Le dosage du NT proBNP (peptide Nterminal du BNP) est réservé à l'exploration des patients traités par r Entresto® (Sacubitril – Valsartan).

Le sacubitril est un inhibiteur de néprilysine, néprilysine qui inhibe l'endopeptidase responsable de la dégradation du BNP. L' Entresto® agit donc en augmentant la durée de vie du BNP.

Le BNP est augmenté pendant le traitement et un mauvais marqueur de l'insuffisance cardiaque alors que le NTproBNP qui est le témoin de la sécrétion cardiaque de proBNP est le marqueur recommandé.

L'agence de biomédecine exige un dosage de NT ProBNP pour les patients traités par Entresto® et candidats à une greffe cardiaque afin d'établir un Score Cardiaque (Cf. Guide du Score Cœur, octobre 2017)



Les valeurs seuils diffèrent en fonction de l'âge :

	référence	augmentation significative
Moins de 45 ans	<125 pg/mL	>180 pg/mL
45-54 ans	<125 pg/mL	>275 pg/mL
55-64 ans	<300 pg/mL	>465 pg/mL
65-74 ans	<425 pg/mL	>1400 pg/mL
plus de 75 ans	<425 pg/mL	>2100 pg/mL

Date d'application : 12/10/2018

TABLEAU D'APPROBATION

	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	LACAPE GENEVIEVE	CHAUZIT EMMANUELLE	BATS MARIE-LISE	BERARD ANNIE	POMMIERS SYLVIE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				