

BONNES PRATIQUES DE PRESCRIPTION DES D-DIMERES

Ce test, réalisé par ELISA, est à distinguer du dosage des D-Dimères latex réalisés dans le bilan de CIVD.

Chez qui prescrire ?

Patients suspects d'un évènement thrombo-embolique veineux en cours avec une probabilité clinique faible ou intermédiaire (scores, voir ci-dessous).

Chez qui ne pas prescrire ?

Age >80 ans

Cancer

Chirurgie

Réanimation

Toute pathologie infectieuse ou inflammatoire en cours

Grossesse

Comment interpréter les résultats ?

<500ng/ml : a priori pas de thrombose et arrêt des investigations

>500 ng/ml : thrombose non éliminée, continuer les explorations

Ne pas refaire l'analyse avant trois jours si le taux initial est supérieur à 500 ng/ml

Date d'application : 14/11/2016

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	VALIDATION (fonction qualité)	AVIS EXPERT (facultatif)	APPROBATION (responsable d'activité)	
Nom :	FREYBURGER GENEVIEVE	CHAUZIT EMMANUELLE	PEUCHANT EVELYNE	POMMIERS SYLVIE	JAMES CHLOE
Signature :	DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT				